



## TABLEAU DES MEDICAMENTS IMMUNOSUPPRESSEURS

**Domaine d'intervention :** Greffe

**Thème :** Traitement

**Catégorie :** Outil éducatif

Tableau des médicaments pour éducation thérapeutique											
IMMUNOSUPPRESSEURS	Substances				Moyens de prise	Précautions particulières	Effets secondaires	Contre-indications	Indications	Durée	Précautions
	CP	forme	usage	autres							
Concerta®/médicament 1mg, 3mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, solution buvable	oral	oral	antidépresseur	oral	au cours des repas		HTA, rétention hydrosolée, prise de poids, brèche de la croissance, manifestations catarrhales, anxiété, hyperichthéose, syndrome de Cushing, changement de comportement		anti-infectieux, anti-rejet	à vie	régime sans sucre et sans sel à privilégier avant les repas
Ciclosporine A - Neboral (5mg), (10mg), (20mg), (50mg)	oral	oral	antidépresseur	oral	prendre 15 min avant repas - respecter 15 h entre chaque prise pas plus de 1h		HTA, hypomagnésémie, tremblements des extrémités, hypertrichose, anémie, strabisme, hypertrichose gingivale, troubles gastro-intestinaux		anti-rejet (greffe)	à vie	Attention: compatibilité avec diverses infections. Pas de jus de pamplemousse. Ne pas rincer la bouche. Attention: respecter votre régime alimentaire à 15, bien-christ et compléto. Attention: interaction avec certains ATB pour avec modicoms
Tacrolimus - modigraf (0,1mg), 0,2mg, 0,5mg (gélule)	oral	oral	antidépresseur	oral	prendre 15 min avant repas jusqu'à la dernière heure		diabète, hypoglycémie, hyperkaliémie, HTA, anémie, insomnie, céphalée, tremblements, diarrhée nasale		anti-rejet (greffe)	à vie	
Sirolimus - Rapamune (1mg), (2mg), (5mg)	oral	oral	antidépresseur	oral	en 2 ou 3 prises 12-14h après le 1er médicament		diarrhées, hypoglycémie, HTA, hypercalcémie, anémie, céphalée, tremblements, diabète, insomnie, anémie		anti-rejet	à vie	soif (interaction avec alcool) (antibiot)
Everolimus - certican (0,5mg), 0,25mg, 0,5mg, 1mg	oral	oral	antidépresseur	oral	15 min avant repas		diarrhées, vomissements, neutropénie, toux, anémie, céphalée, trouble digestif, HTA, infection virale, ecchymose		anti-rejet	à vie	éviter jus de pamplemousse, attention interaction avec certains médicaments

### Classement dans référentiel de compétences

- Compétences d'auto-soins :
  - Comprendre et s'expliquer son traitement
  - Repérer comment prendre ses traitements de façon adaptée

### Objectifs

- Acquérir des connaissances sur les traitements
- Comprendre l'intérêt des traitements pour une meilleure observance

**Population :** Parents et adolescents, grands enfants

**Centre proposant l'outil :** CHU de LYON

**Equipe :** Equipe de néphrologie pédiatrique du CHU de LYON

**Personnes référentes :** Karine COUCHOUD et Séverine SEMLALI infirmières référentes dialyse

**Téléphone :** 04 27 85 61 33 (dialyse) 04 27 85 60 42 (cadre)

**Mail :** [karine.couchoud@chu-lyon.fr](mailto:karine.couchoud@chu-lyon.fr) (infirmière référent dialyse)

[Séverine.semlali@chu-lyon.fr](mailto:Séverine.semlali@chu-lyon.fr) (infirmière référent dialyse)

[Danielle.gustin@chu-lyon.fr](mailto:Danielle.gustin@chu-lyon.fr) (cadre)